

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата

**Регистрационный номер:** П N015127/01

**Торговое название препарата:** Пиаскледин 300

**Международное непатентованное название ~**

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав** на одну капсулу:

*Действующие вещества:* авокадо масла неомыляемые соединения 100 мг, соевых бобов масла неомыляемые соединения 200 мг.

*Вспомогательные вещества:* бутилгидрокситолуол 0,03 мг, кремния диоксид коллоидный 7 мг.

*Состав оболочки капсулы:*

Капсулы корпус: титана диоксид 2 %, желатин до 100 %.

Капсулы крышка: титана диоксид 2 %, желатин до 100 %.

*Связующий раствор (состав для герметизации капсулы):* полисорбат-80 0,25 мг, желатин 5,75 мг.

*Состав чернил «TekPrint™ SW-9008 Black Ink» для маркировки капсулы:* шеллак, этанол, изопропанол, бутанол, пропиленгликоль, аммиака раствор концентрированный, калия гидроксид, железа оксид черный.

**Описание:** капсулы (тип I) с белым колпачком и непрозрачным белым корпусом с маркировкой «P 300». Содержимое капсул – паста коричневого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** корректор метаболизма костной и хрящевой ткани

**Код АТХ:** M09AXA01AD

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Препарат растительного происхождения, регулирует процессы обмена в хрящевой ткани. Обладает симптоматическим противовоспалительным, обезболивающим действием на суставы. Способствует замедлению дегенеративного процесса в хрящевой ткани суставов, уменьшает боли в суставах, связанные с этим процессом, восстанавливает двигательную функцию. В проведенных экспериментальных исследованиях было доказано, что препарат оказывает регенерирующее действие на хрящ, стимулируя синтез коллагена в суставных хондроцитах. Действие неомыляемых соединений масла соевых бобов и масла авокадо увеличивает продукцию коллагена и ингибируют стимулирующее влияние интерлейкина-1 (ИЛ-1) на синтез коллагеназы.

Неомыляемые соединения масла соевых бобов и масла авокадо:

- повышают выработку ингибитора активатора плазминогенеза, тем самым, уменьшая повреждение хряща, как опосредованно через стимуляцию металлопротеиназ, так и путем прямого воздействия на хрящ, активируя деградацию протеогликанов, что предотвращает разрушение хряща;
- повышают действие трансформирующего фактора роста  $\beta_1$  (TGF) в хондроцитах, который обладает мощным анаболическим свойством;
- регулируют синтез макромолекул межклеточного вещества суставного хряща, являются мощным стимулятором синтеза макромолекулы гиалинового хряща, а также периодонтальной ткани, предотвращая выпадение зубов.

**Показания для применения:**

- комплексная терапия остеоартроза коленных и тазобедренных суставов I – III стадии.
- адьювантная терапия периодонтитов.

**Противопоказания для применения:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- период беременности и грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Принимают внутрь по 1 капсуле в день, предпочтительно утром во время еды, запивая 250 мл воды. Курс лечения 6 месяцев. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после консультации с врачом.

**Особые указания**

На начальном этапе лечения прием Пиаскледина 300 может быть совмещен с приемом НПВП и/или анальгетиков.

**Симптомы передозировки и методы лечения**

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Пиаскледин 300 не сообщалось.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Крайне редко возможно повышение следующих лабораторных показателей: трансаминаз, щелочной фосфатазы, билирубина и гамма-глутамилтранспептидазы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описаны.

**Применение в период беременности и грудного вскармливания**

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания не рекомендуется.

**Влияние на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами**

Не влияет на деятельность, требующую повышенной концентрации внимания и быстроту психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Капсулы 300 мг.

По 15 капсул в блистере из алюминиевой фольги, покрытой термоустойчивой смолой и поливинилхлоридной пленкой.

1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности** 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускают без рецепта.

**Произведено:**

Лаборатория Экспансьянс, Франция

Юридический адрес: 1 Пляс де Сезон 92048 Париж ля Дефанс Седекс, Франция

Адрес производства: Рю де Катр Фий, 28230 Эпернон, Франция

**Получить дополнительную информацию о препарате, а также направить претензии и информацию о нежелательных явлениях можно по адресу:**

АО «Си Эс Си ЛТД»

115478, г. Москва, Каширское шоссе, 23, гостиница «Дом Ученых» ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 2 этаж, комната А.

тел. (499) 324 96 40, 324 76 36, 324 92 30, факс: (499) 324 91 40.

<http://www.cscpharma.info>.